



When To Keep Your Child Home From School

Chickenpox

Keep child home until they have no new sores for **24 hours AND** all sores are **dried and crusted**.

During an outbreak of chickenpox, children who are NOT vaccinated for chickenpox (Varicella) and have been in close contact with someone sick with the infection will not be allowed at school for 21 days after they were last exposed to chickenpox, even if they are not sick.

Diarrhea

Keep child home with two loose or watery stools within **24 hours**, even if there are no other signs of illness. Keep child home until no diarrhea for **24 hours**.

Fever

Keep child home with temperature **100.5 degrees** or higher. Keep child home until fever-free for **24 hours** **without** using fever-reducing medicine such as Motrin and Tylenol.

Flu-like symptoms

Sudden onset of fever, chills, muscle aches; may also have vomiting and diarrhea.

Keep child home until symptom-free for **24 hours**.

Head lice

Keep child home until treatment is completed and all live lice are gone.

Impetigo

Keep child home until **treatment has been started**. **Lesions must be covered while in school.**

MRSA

Keep child home if sore is draining, and cannot be covered with a clean, dry bandage. Keep child home if they cannot keep from picking at sore.

Rash

Keep child home until **seen by a doctor** and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

Strep throat

Keep child home until **24 hours** after the first dose of antibiotics have been started.

Pink eye

Keep child home until **seen by a doctor and until 24 hours** after first dose of medicine, if prescribed.

Ringworm

Keep child home until **seen by a doctor and until treatment has been started**. Area must remain covered at school until completely healed.

Scabies

Keep child home until treatment is completed.

Vomiting

Keep child home until no vomiting for **24 hours**.

Abdominal Pain

Keep child home with abdominal pain that continues for more than 2 hours or intermittent pain with a fever or other symptoms.



Students First

Inspire, Educate, Celebrate

الأسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة

الجدي

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة ٢٤ ساعة و إلى أن تجف جميع القروح و تقشر.
خلال تفشي جدي الماء، لن يسمح للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجدي الماء (فاريسيلا) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعدوى بالتواجد في المدرسة لمدة ٢١ يوماً بعد تعرضهم لجدي الماء، حتى لو لم يكونوا مرضى.

الإسهال

إبقاء الطفل المنزل في حال كون البراز طرياً أو سائلاً في غضون ٢٤ ساعة، حتى لو لم يكن هناك أي علامات أخرى من المرض الرجاء إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال أعراض الإسهال.

الحمى:

الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصل إلى ١٠٠،٥ درجة فهرنهايت أو أكثر. إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة و استمرار زوالها مدة ٢٤ ساعة دون استعمال أي أدوية خافضة للحرارة مثل الموترن أو تايلنول

أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا

ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور القشعريرة، الأم في العضلات، من الممكن أيضاً الإصابة بالإسهال و القيئ.
يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال العوارض السابقة دون تناول أي دواء.

قمل الرأس

إذا تم اكتشاف القمل للمرة الأولى في المدرسة سوف يسمح للطفل بإكمال اليوم الدراسي لنهايته يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين إتمام المعالجة و زوال جميع الحشرات الحية

الحصف (داء جلدي)

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب. جب تغطية الأفات أثناء وجوده في المدرسة.

عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمثسليين

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القروح ملتهبة و متقيحة و لا يمكن تغطيتها بلاصقة طبية نظيفة و جافة. يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم يكن بمقدوره التوقف عن حك القروح

الطفح الجلدي

يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب و تلقي العلاج إذا لزم الأمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة

التهاب الحلق

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب.

التهاب باطن العين

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء

القوباء الحلقية مرض جلدي

إبقاء الطفل في المنزل حتى يراه الطبيب وحتى يبدأ العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى تلتئم تماما.

الجرب

يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العلاج.

الأقياء

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا ما تقيئ مرتين أو أكثر خلال ال ٢٤ ساعة يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة عليه دون إقياء.

آلام معوية

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بألم في البطن يستمر لأكثر من ساعتين أو ألم منقطع مع حمى أو أعراض أخرى.